



Paroisse
D'HILBESHEIM, HOMMARTING,
REDING
(Communauté de paroisses
Sainte-Agathe)

Soyez les bienvenus dans cette
église.

En y pénétrant, vous vous engagez à
respecter les mesures prises durant la
période de déconfinement et les

recommandations du gouvernement affichées à la porte de cette église :

J'ai bien pris connaissance de l'affiche sur les gestes barrières à respecter et accepte de désinfecter mes mains à l'entrée de l'église ;

J'ai bien pris conscience du nombre limité de places, devant m'asseoir sur une des places prévues pour les membres de l'assemblée réduite ;

Je ne donnerai pas le geste de paix à mon voisin avant la communion ;

Je garderai une distance d'1 mètre avec la personne qui me précède et qui me suit durant la procession de communion ;

Je communierai uniquement en présentant mes mains ouvertes et en veillant à ce que la paume de la main recevant l'hostie consacrée soit bien tendue pour éviter tout contact avec le célébrant ;

Durant tout l'office et durant la procession de sortie, je respecterai la distance règlementaire d'1 mètre ;

J'ai pris parfaite connaissance de la liste des personnes dites « vulnérables », c'est-à-dire « à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 » définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) en date du 20 avril 2020 :

- personnes âgées de 65 ans et plus
- femmes enceintes à partir du 3ème trimestre de grossesse
- patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- diabétiques non équilibrés ou présentant des complications
- personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale
- patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée
- malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
- personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement)
- malades de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
- personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle (IMC) > 30kg/m²)
- personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur en raison d'un risque accru de surinfection bactérienne ou de syndrome thoracique aigu ou ayant un antécédent de splénectomie.